

HIV TREATMENT CAN PREVENT SEXUAL TRANSMISSION

PEOPLE WITH HIV SHOULD TAKE MEDICINE TO TREAT HIV AS SOON AS POSSIBLE TO



- Improve their own health, and
- Prevent transmitting HIV to other people.



HIV medicine can reduce the amount of HIV in the blood (also called **viral load**). HIV medicine can make the viral load so low that a test can't detect it.

This is called **undetectable viral load**.

Having an undetectable viral load (or staying virally suppressed*) is the best thing people with HIV can do to stay healthy. If their viral load stays undetectable, they have **effectively no risk** of transmitting HIV to their sex partner.

IF YOU HAVE HIV AND WANT TO GET AND KEEP AN UNDETECTABLE VIRAL LOAD, YOU WILL NEED TO



- **Take medicine daily as prescribed.** Most people can get virally suppressed within 6 months of starting treatment. Missing some doses can increase your viral load and the risk of transmitting HIV. Talk to your health care provider about ways to follow your treatment plan.



- **See your provider regularly to check your viral load.** Not everyone taking HIV medicine has an undetectable viral load. The only way to know if you have an undetectable viral load is by getting tested regularly.

GETTING AND KEEPING AN UNDETECTABLE VIRAL LOAD PREVENTS HIV TRANSMISSION DURING SEX. EVEN IF THE PARTNER WITH HIV HAS AN UNDETECTABLE VIRAL LOAD, EITHER PARTNER MAY WANT TO USE ADDITIONAL PREVENTION OPTIONS.

Using condoms can protect you from other STDs. Using condoms or having the partner without HIV take PrEP (pre-exposure prophylaxis) can provide added peace of mind. Also consider using additional prevention options if the partner with HIV

- is unsure that they have an undetectable viral load;
- is having difficulty keeping an undetectable viral load; or
- missed some doses of medicine since the last viral load test, stops taking their medicine, or has trouble taking it regularly.

Get tested for other STDs. HIV treatment doesn't protect against other STDs like syphilis and gonorrhea, and other STDs can increase the chance of getting or transmitting HIV.



* Being virally suppressed means having a very low viral load (less than 200 copies of HIV per milliliter of blood). The benefits of having an undetectable viral load also apply to people who stay virally suppressed.



EL TRATAMIENTO DEL VIH PUEDE PREVENIR LA TRANSMISIÓN SEXUAL

LAS PERSONAS QUE TIENEN EL VIH DEBEN TOMAR LOS MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL VIRUS TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE



- para mejorar su propia salud, y
- para prevenir la transmisión del VIH a otras personas.



Los medicamentos para el VIH pueden reducir la carga viral tanto que la prueba no pueda detectarla. Esto se llama **carga viral indetectable**.

Tener una carga viral indetectable (o mantener la supresión viral*) es lo mejor que las personas con el VIH pueden hacer para mantenerse sanas. Si su carga viral se mantiene indetectable, no tienen efectivamente ningún riesgo de transmitirle el VIH su pareja sexual.

SI USTED TIENE EL VIH Y QUIERE ALCANZAR Y MANTENER UNA CARGA VIRAL INDETECTABLE, DEBERÁ HACER LO SIGUIENTE



- **Tomar los medicamentos todos los días según las instrucciones de la receta.** La mayoría de las personas puede lograr la supresión viral dentro de los 6 meses después de comenzar con el tratamiento. Saltarse algunas dosis puede aumentar su carga viral y el riesgo de transmitir el VIH. Hable con su proveedor de atención médica sobre las maneras de seguir con el plan de tratamiento.



- **Ver al proveedor de atención médica con regularidad para que revise su carga viral.** No todas las personas que toman los medicamentos para el VIH logran una carga viral indetectable. La única manera de saber si usted tiene una carga viral indetectable es hacerse las pruebas regularmente.

LOGRAR Y MANTENER UNA CARGA VIRAL INDETECTABLE PREVIENE LA TRANSMISIÓN DEL VIH DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES. AUNQUE EL MIEMBRO DE LA PAREJA CON EL VIH TENGA UNA CARGA VIRAL INDETECTABLE, QUIZÁS UNO O EL OTRO QUIERA USAR OPCIONES DE PREVENCIÓN ADICIONALES.

El uso de condones puede protegerlo de otras ETS. Si usan condones, o el miembro de la pareja que no tiene el VIH toma la PrEP (los medicamentos de profilaxis preexposición), esto les puede dar más tranquilidad. También consideren usar opciones de prevención adicionales si el miembro de la pareja que tiene el VIH:

- no está seguro de si su carga viral es indetectable;
- tiene dificultad para mantener una carga viral indetectable; o
- no tomó algunas dosis de los medicamentos desde que se hizo la última prueba de carga viral, deja de tomar los medicamentos o tiene dificultad para tomarlos regularmente.

Hágase las pruebas de detección de otras ETS. El tratamiento del VIH no protege contra otras ETS como la sífilis y la gonorrea, y tener otras ETS puede aumentar la probabilidad de contraer o transmitir el VIH.



* Tener supresión viral significa tener una carga viral muy baja (menos de 200 copias del VIH por mililitro de sangre). Los beneficios de tener una carga viral indetectable también los tienen las personas que mantienen la supresión.